



FICHA TÉCNICA

Enraizador y potencializador de la absorción nutrimental.

¿Qué es?

ERZmax es un complejo regulador de crecimiento vegetal y potencializador de la absorción nutrimental, formación y multiplicación de raíces, su formulación líquida con base húmico y fúlvico, que contiene fitohormonas, aminoácidos, ácidos orgánicos, Nutrientes NPK como ingrediente activo, siendo la combinación más eficaz en la promoción de la iniciación de la formación de raíces adventicias o laterales. Induce el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces manteniendo la estimulación por periodos prolongados, sin restricciones para su desempeño y de manera segura. Con la generación de raíces de forma constante y sanas se asegura la absorción nutrimental, agua y oxígeno, así como un buen anclaje de las plantas.

¿Cómo funciona?

La auxina contenido en el Erz Max produce un ablandamiento de la pared celular gracias a que crea un medio ácido y así la célula puede crecer en tamaño, a largo plazo produce cambios en la expresión génica. Favorece el crecimiento celular, la división celular, diferenciación del tejido vascular, el crecimiento del tallo, el inicio de raíces laterales, ayuda a la respuesta de las plantas a la gravedad, que les permite dirigir sus raíces en la dirección correcta. Esta respuesta es vital para la germinación y para la supervivencia de las plantas jóvenes. haciendo que el tallo crezca hacia arriba y las raíces hacia abajo, establece la polaridad del embrión, afecta al envejecimiento y caída de las hojas, retrasa la maduración de los frutos. Otra acción de la auxina es, en combinación con el etileno, promover flores femeninas en las plantas dioicas.

El fósforo mediante la tecnología MRT ayuda como fuente de energía, transporte de nutrientes y división celular, la combinación balanceada con nitrógeno y potasio así como aminoácidos específicos le aporta el empuje correcto e idóneo a los cultivos para generar raíces nuevas de anclaje y absorción misma que se refleja en sistema radicular abundante y una planta vigorosa.

¿Qué beneficios trae?

- Sistema radicular de anclaje y absorción abundante.
- Empuje mediante fuentes energéticas para la planta.
- Inducción radicular a largo plazo mediante aminoácidos específicos.
- Regeneración celular acelerada.



Enraizador y potencializador

Composición Garantizada

Ingrediente Activo	Contenido (p/p)
Auxina	2000 ppm
Citocininas	600 ppm
Giberelinas	500 ppm
Nitrogeno	5.00%
Fosforo (P_2O_5)	15.00 %
Potasio (K_2O)	5.00 %
Aminoacidos libres	5.00 %
Acido humico y fulvico	8.00 %
Tecnología MRT	

Principales características

Parámetro	Valor
Color	Café
pH	3.8
CE	> 20
Densidad	1.3 gr / cc a 20 °C



Distribuido por:
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN EL SEED SA DE CV.
CALLE ZARAGOZA 6B, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA.
TELÉFONO 951 347 6976 , 951 257 5041
CORREO: casaagricolaelseed@hotmail.com





Recomendaciones de uso

Este producto puede utilizarse en cualquier cultivo, en cualquier etapa de desarrollo. Para obtener mejores resultados se sugiere integrar este producto en un programa nutricional de manejo de cultivo.

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Aplicación / Observaciones
Cebolla, Zanahoria	1	30 días después de la siembra, aplicación vía sistema de riego.
Chile, Tomate, Tomate de Cáscara, Pimiento, Berenjena	0.5 - 1	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. 1 a 2 aplicaciones al iniciando el llenado de frutos.
Espárrago	0.5	Aplicar cada 4 meses, aplicación vía sistema de riego.
Sandia, Melón, Calabaza, Pepino)	0.75 a 1	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. 1 a 2 aplicaciones al inicio del llenado de frutos.
Col, Broccoli, Coliflor	0.75 a 1	1 a 2 aplicaciones al trasplante. 1 aplicación al desarrollo de las inflorescencias.
Hortalizas de bulbo	0.75 a 1	1 a 2 aplicaciones al trasplante a un intervalo de 10 días. 1 a 2 aplicaciones al inicio de formación y llenado de bulbo.
Arándano, frambuesa, zarzamora	0.75 a 1	Aplicación a inicio de desarrollo vegetativo. 1 a 2 aplicaciones durante el periodo de cortes con un intervalo de 20 días.
Fresa	0.75 a 1	Aplicación a inicio de desarrollo vegetativo. 1 a 2 aplicaciones durante el periodo de cortes con un intervalo de 20 días.
Papaya	1 a 2	Aplicación al trasplante. 2 a 3 aplicaciones distribuidas en el periodo de cortes en intervalos de 15 días.
Banano	1 a 2	Aplicación al inicio del desarrollo vegetativo o inicio de desarrollos de nuevos vástagos.
Ornamentales	1 a 2	Aplicación al inicio del desarrollo vegetativo o inicio de desarrollos de nuevos vástagos.
Manzano, vid, durazno	1 a 3	Aplicación al inicio y en pleno desarrollo vegetativo Aplicación a 45 días después de cosecha para apoyar el almacén de reservas en raíces antes de dormancia.
Cítricos, piña, mango, cacao	1 a 3	Aplicación en pleno desarrollo vegetativo, cuando es esperada la mayor emisión de raíces durante el ciclo.
Papa	1	30 a 45 días después de la siembra, aplicación vía sistema de riego.

Precauciones

El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación, utilizando guantes en las manos antes de quitar con las manos el sello de garantía. Agite el envase antes de abrir, a fin de homogenizar el producto, diluirlo antes en poca agua antes de verterlo al tanque de aplicación definitivo. Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque se tenga los guantes puestos. Efectuar el tratamiento en las horas más frescas del día. ERZ max , es estable en un rango de pH de 4 a 11 y es un producto para aplicación radicular. El producto no presenta problemas de conservación si se almacena a una temperatura comprendida entre - 5°C y 35 °C

Presentaciones Disponibles



250 ml



500 ml



1 L



5 L

Distribuido por:
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN EL SEED SA DE CV.
CALLE ZARAGOZA 6B, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA.
TELÉFONO 951 347 6976 , 951 257 5041
CORREO: casaagricolaelseed@hotmail.com

